

**Общероссийская общественная организация  
«Ассоциация медицинских сестер России»**

**ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ  
В РАМКАХ СИСТЕМЫ НМО**

---

**Межрегиональной научно-практической конференции  
«Роль фельдшера в совершенствовании системы оказания  
скорой медицинской помощи на догоспитальном этапе»  
28 октября 2016 г. г. Омск**

**ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ**

☒ **Выберите правильный ответ**

**1. Нормой транспортной доступности для подстанций скорой помощи считается:**

- ☐ 5 минут
- ☐ 20 минут
- ☐ 10 минут

**2. Скорая медицинская помощь оказывается бесплатно:**

- ☐ всем нуждающимся
- ☐ только при вызове в общественное место
- ☐ только гражданам РФ

**3. Больные и пострадавшие, доставленные бригадой скорой помощи, должны быть осмотрены в приемном отделении стационара не позднее:**

- ☐ 55 минут после доставки
- ☐ 5 минут после доставки
- ☐ 3 часов после доставки

**4. Находящаяся в пути следования бригада скорой помощи, встретившись на улице с несчастным случаем, обязана остановиться:**

- ☐ Всегда

- ☐ Только если она следует с вызова без пациента  
☐ Только если она следует на вызов

**5. Показания для проведения системной тромболитической терапии:**

- ☐ Перикардит  
☐ ОКС с подъемом сегмента ST  
☐ Расслаивающая аневризма аорты

**6. Возможные осложнения системной тромболитической терапии:**

- ☐ Анафилактические реакции  
☐ Нарушения сердечного ритма  
☐ Все ответы верны

**7. Какой из нижеперечисленных препаратов наиболее эффективен у пациентов в состоянии клинической смерти:**

- ☐ Адреналин  
☐ Эуфиллин  
☐ Верапамил

**8. Наиболее ранним признаком остановки кровообращения является:**

- ☐ отсутствие пульса на сонных артериях  
☐ отсутствие артериального давления  
☐ отсутствие самостоятельного дыхания

**9. Объем вдыхаемого воздуха при проведении ИВЛ взрослому человеку:**

- ☐ 100 – 200 мл.  
☐ 800 – 1000 мл.  
☐ 250 – 300 мл.

**10. Во время проведения реанимационного пособия лекарственные препараты вводят:**

- ☐ Внутривенно  
☐ Внутримышечно  
☐ Внутрисердечно

**11. Для обеспечения проходимости верхних дыхательных путей необходимо:**

- ☐ Максимально запрокинуть голову назад, вывести нижнюю челюсть вперед
- ☐ Повернуть голову на бок
- ☐ Уложить пациента на живот

**12. При отсутствии возможности ввести медикаменты внутривенно пациентам в состоянии клинической смерти, их вводят:**

- ☐ Подкожно
- ☐ Интратрахеально
- ☐ Внутримышечно

**13. При остром инфаркте миокарда транспортировка пациента до машины осуществляется:**

- ☐ Самостоятельно пешком
- ☐ Только на носилках

**14. Препаратом выбора для купирования болевого синдрома при ОКС является:**

- ☐ Анальгин 50%
- ☐ Трамадол 5%
- ☐ Морфин 1%

**15. Наиболее короткодействующим наркотическим анальгетиком является:**

- ☐ Морфин 1%
- ☐ Фентанил 0,005%
- ☐ Промедол 2%

**16. При остром инфаркте миокарда противопоказано введение:**

- ☐ Сердечных гликозидов
- ☐ Наркотических препаратов

**17. Препарат, относящийся к группе нестероидных противовоспалительных средств:**

- ☐ Кеторол

- ☐ Трамадол 5%
- ☐ Дигоксин

**18. Абсолютные показания для проведения электрической дефибрилляции:**

- ☐ Фибрилляция желудочков
- ☐ Брадикардия
- ☐ Синусовая тахикардия с частотой до 140 ударов в минуту

**19. Тройной прием Сафара включает в себя:**

- ☐ Запрокидывание головы, выведение нижней челюсти и открытие рта
- ☐ Поворот головы влево и введение воздуховода
- ☐ Запрокидывание головы и введение воздуховода

**20. Неэффективная реанимация проводится:**

- ☐ 15 минут
- ☐ 2 часа
- ☐ 30 минут